

# Images in medicine

## Tumeur de la muqueuse buccale

Iman Hadj<sup>1,&</sup>, Fatima Zahra Mernissi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>CHU Hassan II, Fès, Maroc

<sup>&</sup>Corresponding author: Iman Hadj, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Key words: Diapneusie, muqueuse buccale, tumeur

Received: 16/05/2014 - Accepted: 24/05/2014 - Published: 04/06/2014

**Pan African Medical Journal. 2014; 18:113 doi:10.11604/pamj.2014.18.113.4612**

This article is available online at: <http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/18/113/full/>

© Iman Hadj et al. The Pan African Medical Journal - ISSN 1937-8688. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

### Image en médecine

La diapneusie est une tumeur bénigne correspondant à une hyperplasie fibro-épithéliale, Siégeant sur la muqueuse des lèvres, des joues ou des bords de la langue. Elle est attribuée à l'aspiration de la muqueuse à travers un orifice de l'arcade dentaire. Cliniquement, elle se présente sous forme d'un nodule sessile de quelques millimètres de diamètre, de consistance molle, parfois ferme, indolore, souple, sa surface est recouverte d'une muqueuse normale et le sommet de la lésion est parfois occupé par une plaque kératosique ou une ulcération associée au traumatisme masticatoire. Elle est toujours bénigne mais elle récidive tant que l'étiologie n'a pas été éliminée. Le traitement consisté en l'exérèse chirurgicale, enseignement pour éviter le tic de succion, et le traitement orthodontique pour fermer les espaces et corriger le chevauchement qui est en cause du tic de succion. Nous rapportons le cas d'une patiente de 19 ans, sans antécédents pathologiques notables, qui consulte pour une tumeur de la face interne de la joue droite évoluant depuis 3 mois. L'examen clinique révèle la présence d'une tumeur sessile de 15 millimètres de diamètre, de consistance ferme, indolore, souple, la muqueuse de recouvrement est d'aspect normal avec au sommet une plaque kératosique. la patiente a bénéficié d'une exérèse chirurgicale avec étude anatomopathologique qui a confirmé le diagnostic en montrant un tissu de collagène quasi avasculaire, emprisonnant des fibres musculaires désorganisées

recouvert d'un épithélium malpighien hyperplasique, légèrement kératinisé en surface avec absence de tissu adipeux et de réaction cellulaire inflammatoire.



**Figure 1:** Tumeur sessile de 15 millimètres de diamètre, de consistance ferme, indolore, souple. La muqueuse de recouvrement est d'aspect normal avec au sommet une plaque kératosique