

Images in medicine

Nodule unguéal chez les sportifs: penser à l'exostose sous unguéale

Ouakrim Redouane^{1&}, Ahmed El Bardouni¹

¹Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

[&]Corresponding author: Ouakrim Redouane, Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Key words: Exostose, sous unguéale, sportif, nodule

Received: 07/04/2015 - Accepted: 20/04/2015 - Published: 23/04/2015

Pan African Medical Journal. 2015; 20:402 doi:10.11604/pamj.2015.20.402.6766

This article is available online at: <http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/20/402/full/>

© Ouakrim Redouane et al. The Pan African Medical Journal - ISSN 1937-8688. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Image en médecine

L'exostose sous unguéale est une tumeur ostéo-articulaire bénigne relativement rare, à tendance récidivante, touchant essentiellement le gros orteil. L'étiopathogénie est inconnue, plusieurs théories ont été avancées dont la principale est en rapport avec la notion de traumatisme ou microtraumatisme. Plusieurs diagnostics différentiels doivent être évoquer en particulier le chondrome phalangien, ostéo-chondrome, fibrome sous unguéale, et le mélanome achromique. L'excision chirurgicale reste le principal traitement avec un risque de récurrence non négligeable. Nous rapportons le cas d'un homme de 28 ans, sans antécédents particuliers, footballeur professionnel, qui a consulté pour un nodule sous unguéal douloureux du gros orteil droit évoluant depuis 4 mois sans autres signes associés. L'examen clinique a révélé un nodule dur de 15 mm de diamètre, de couleur chair, siégeant au niveau sous unguéal. Le reste de l'examen somatique a été normal. Une radiographie osseuse du pied a révélé une excroissance osseuse en continuité avec la phalangette, à développement latéral. Ce qui a permis de confirmer le diagnostic d'une exostose sous unguéale. Une exérèse chirurgicale a été réalisée. Les suites opératoires ont

été simples. Le patient n'a pas fait de récurrence avec un recul de 1 an.



Figure 1: (A) nodule sous unguéal; (B): exostose du gros orteil droit