

Abdomen aigu sur une torsion de rate ectopique: à propos d'un cas

Elhattabi Khalid^{1,&}, Bensardi Fatimazahra¹, Lefriyekh Rachid¹, Fadil Abdelaziz¹, Lahkim Mohamed¹, Benissa Nadia¹, Khaiz Driss¹, Berrada Saad¹, Zerouali Ouariti Najib¹

¹Service des urgences chirurgicales viscérales – CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

&Auteur correspondant

Elhattabi Khalid, service des urgences chirurgicales viscérales Pavillon 35, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Résumé

La rate ectopique est une entité rare dont l'incidence est mal connue. La torsion de son pédicule est une complication grave, qui doit bénéficier d'un diagnostic précoce; évitant ainsi la splénectomie surtout chez des patients jeunes. Nous rapportons le cas d'une patiente âgée de 39 ans; admise aux urgences dans un tableau d'abdomen aigu chirurgical, l'examen clinique, l'échographie et la tomodensitométrie abdominales ont contribué au diagnostic de torsion d'une rate ectopique en position hypogastrique, la splénectomie a été réalisée devant la découverte peropératoire de taches de nécrose sur la rate tordue. Le diagnostic de torsion d'une rate ectopique doit être suspecté devant l'association d'un abdomen aigu et la palpation d'une masse abdominale. L'échographie et la tomodensitométrie abdominale confirment le diagnostic. Le traitement est chirurgical; il consiste en une splénopexie qui est plus approprié. En présence de nécrose, la splénectomie doit être réalisée aussi bien par voie laparoscopique que par laparotomie.