

Images in medicine

Le pemphigus végétant: une rare dermatose des plis

Mariame Meziane^{1,&}, Fatima-zahra Mernissi¹

¹Service de Dermatologie, CHU Hassan II Fès, Maroc

[&]Corresponding author: Mariame Meziane, Service de Dermatologie, CHU Hassan II Fès, Maroc

Key words: Pemphigus végétant, dermatose des plis, dermatose bulleuse auto-immune

Received: 25/01/2013 - Accepted: 29/01/2013 - Published: 14/08/2013

Pan African Medical Journal. 2013; 15:134. doi:10.11604/pamj.2013.15.134.2411

This article is available online at: <http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/15/134/full/>

© Mariame Meziane et al. The Pan African Medical Journal - ISSN 1937-8688. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Image en médecine

Une patiente de 42 ans, sans antécédents pathologiques notables consultait pour l'apparition depuis 6 mois de lésions cutanées ombilicale et sus pubienne traitées localement et à plusieurs reprises sans amélioration. L'examen clinique retrouvait une patiente en bon état général avec des lésions végétantes, suintantes, malodorantes et violacées au niveau de l'ombilic et au niveau sus pubien. Le signe de Nicolsky était négatif et il n'existait pas d'autres anomalies cutanées ou muqueuses. La biopsie cutanée mettait en évidence une acanthose avec des bulles intraépidermiques suprabasales, l'immunofluorescence directe montrait un dépôt intradermique en résille d'IgG et de C3. Le diagnostic de pemphigus végétant a été retenu. Un traitement par la corticothérapie orale à raison de 1,5mg/kg/j et par l'Azathioprine à 2mg/kg/j a été débuté avec cicatrisation complète des lésions après 3 semaines. Le pemphigus est une dermatose bulleuse auto-immune rare, la forme végétante en est une forme exceptionnelle. Elle se manifeste par des lésions bourgeonnantes en relief, rarement par des bulles et se localise essentiellement au niveau des plis avec risque de macération et de surinfection.



Figure 1: A) Lésions mamelonnées violacées de siège ombilical; B) Aspect de placard végétant violacé macéré au niveau sus pubien

