

## Images in medicine

### Neurofibrome sous-unguéal solitaire

**Kbira El Morabite<sup>1,&</sup>, Baderddine Hassam<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Service de Dermatologie Vénérologie, CHU Ibn Sina, Université Mohamed-V Souissi, Rabat, Maroc

<sup>&</sup>Corresponding author: Kbira El Morabite, Service de Dermatologie Vénérologie, CHU Ibn Sina, Université Mohamed-V Souissi, Rabat, Maroc

Key words: Neurofibrome, neurofibrome solitaire, histologie

Received: 14/05/2013 - Accepted: 21/06/2013 - Published: 18/08/2013

**Pan African Medical Journal. 2013; 15:140. doi:10.11604/pamj.2013.15.140.2840**

This article is available online at: <http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/15/140/full>

© Kbira El Morabite et al. The Pan African Medical Journal - ISSN 1937-8688. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

### Image en médecine

Le neurofibrome est une tumeur bénigne dont l'origine est la prolifération des cellules périphériques des gaines nerveuses. Il peut se retrouver soit dans le cadre de la neurofibromatose ou soit sous forme d'une tumeur solitaire. Jusqu'à présent, moins de 10 cas de neurofibrome sous-unguéal solitaire non associé à la maladie de Von Recklinghausen ont été rapportés dont 1 seul cas chez le sexe masculin. Sa croissance est généralement lente, peu symptomatique rendant son diagnostic difficile. Son diagnostic repose sur l'examen histologique et son excision chirurgicale complète représente le traitement de choix. Nous rapportons le cas d'un patient âgé de 54 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, qui présente depuis 2 ans, une tumeur sous unguéale du pouce droit, augmentant progressivement de taille. A l'examen, cette tumeur était de couleur chair soulevant partiellement la tablette unguéale, sensible à la palpation, de consistance molle, de 1cm de grand axe. Le reste de l'examen dermatologique et somatique étaient sans anomalies. Plusieurs diagnostics ont été évoqués: un fibrokératome, un fibrome, un fibromyxome et un neurofibrome. Une exérèse

complète de la tumeur était réalisée et l'examen histologique était en faveur d'un neurofibrome solitaire du pouce droit.



**Figure 1:** Tumeur de couleur chair soulevant partiellement la tablette unguéale de 1cm de diamètre

