

Images in medicine

Hidradénome papillifère

Rajaa Elouarradi^{1,&}, Ouafa Hocar¹

¹Service de Dermatologie, CHU Mohamed VI, faculté de Médecine et Pharmacie de Marrakech, Université Cadi Ayyad, Maroc

[&]Corresponding author: Rajaa Elouarradi, Hopital Ibn Tofail, Service de dermatologie, CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Key words: Hidradénome papillifère, nodule, tumeur

Received: 13/03/2014 - Accepted: 11/04/2014 - Published: 14/04/2014

Image en médecine

C'est une tumeur annexielle bénigne à différenciation sudorale rare, qui touche la femme adulte. Elle peut siéger au niveau des grandes lèvres ou la région périnéale. Sur le plan clinique c'est un petit nodule (quelques mm), souvent unique, mobile, élastique, de couleur rose ou bleutée, parfois végétant et hémorragique ou pédiculée. Sur le plan histologique c'est une tumeur kystique encapsulée, située dans le derme profond, sans connexion avec l'épiderme. Cette tumeur est remplie de villosités conjonctives, et la lumière est tapissée de deux assises cellulaires, une assise sécrétrice et une assise de petites cellules cuboïdes à noyaux très basophiles (cellules myoépithéliales). Le diagnostic différentiel est posé devant un kyste wolffien ou une glande mammaire aberrante. Le traitement repose sur l'exérèse chirurgicale.



Figure 1 : hidradénome papillifère de localisation vulvaire

Pan African Medical Journal. 2014; 17:274 doi:10.11604/pamj.2014.17.274.4177

This article is available online at: <http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/17/274/full/>

© Rajaa Elouarradi et al. The Pan African Medical Journal - ISSN 1937-8688. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.