

Images in medicine

Le syringocystadénome des grandes lèvres : une rare dermatose génital

Douhi Zakia^{1,8}, Mernissi Fatima Zahra¹

¹Service de Dermatologie-Vénérologie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

⁸Corresponding author: Douhi Zakia, Service de Dermatologie-Vénérologie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Key words: Syringocystadénome, grandes lèvres, dermatose génitale

Received: 14/07/2014 - Accepted: 03/08/2014 - Published: 10/08/2014

Pan African Medical Journal. 2014; 18:285 doi:10.11604/pamj.2014.18.285.5037

This article is available online at: <http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/18/285/full/>

© Douhi Zakia et al. The Pan African Medical Journal - ISSN 1937-8688. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Image en médecine

Les syringocystadénomes papillifères sont des tumeurs annexielles bénignes à différenciation apocrine apparaissant le plus souvent sur le cuir chevelu en association avec un nævus sébacé. Ces lésions peuvent également s'observer isolément dans la région axillaire et inguinale, comme c'est le cas de notre patiente. Ce sont des lésions papuleuses de petite taille, translucides, ombiliquées, parfois suintantes et croûteuses. Le diagnostic clinique est souvent confondu avec un molluscum contagiosum, une verrue, une lésion inflammatoire. A l'histologie, on trouve une lésion kystique profondément invaginée dans le derme et s'abouchant à la surface, tapissée de végétations endoluminales à double assise cellulaire et à différenciation apocrine. Le stroma est riche en plasmocytes. L'évolution de cette lésion est progressive et présentant souvent des poussées inflammatoires et parfois une surinfection. Le traitement est chirurgical. Nous rapportons le cas d'une patiente de 42 ans, ayant reçu il y a 7 ans un traitement à base de radio-chimiothérapie pour un carcinome épidermoïde du col utérin, qui consulte pour des lésions asymptomatiques au niveau des grandes lèvres évoluant depuis 3 ans. L'examen clinique révèle la présence de multiples papules translucides et rosés au niveau des grandes lèvres avec une pachydermie pubienne. L'examen dermoscopique a objectivé une zone centrale rouge avec une collerette épidermique blanchâtre

périphérique. La patiente a bénéficié d'une biopsie qui a confirmé le diagnostic.



Figure 1: A, B) Multiples papules translucides et rosés au niveau des grandes lèvres, de consistance ferme, indolore avec une pachydermie pubienne post radique; C,D) Aspect dermoscopique des lésions : zone centrale rouge avec une collerette épidermique blanchâtre