

## Images in medicine

### Enorme botryomycome du gros orteil

#### *Large botryomycoma of the big toe*

Younes Mhammdi<sup>1,&</sup>, Mustapha Mahfoud<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Service de Traumatologie Orthopédie, Hopital Ibn Sina, CHU, Rabat, Maroc

<sup>&</sup>Corresponding author: Younes Mhammdi, Service de Traumatologie Orthopédie, Hopital Ibn Sina, CHU, Rabat, Maroc

Mots clés: Botryomycome, ongle incarné, tumeur du gros orteil

Received: 03/01/2016 - Accepted: 04/01/2016 - Published: 20/05/2016

**Pan African Medical Journal. 2016; 24:69 doi:10.11604/pamj.2016.24.69.8776**

This article is available online at: <http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/24/69/full/>

© Younes Mhammdi et al. The Pan African Medical Journal - ISSN 1937-8688. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

### Image en médecine

*The authors report the case of a 34-year old patient with large botryomycoma of the big toe developed on an ingrown nail. The patient underwent surgical resection of the tumor and curative treatment of the ingrown nail. This tumor was considered exceptional due to its size: 2cm diameter, whose nature was confirmed by anatomopathologic study. The patient was scheduled for follow-up visits on a regular basis: healing was achieved at the 3rd week, no recurrence at the 6-month follow-up.*

**Key words:** Botryomycoma, ingrown nail, tumeur du gros orteil

Les auteurs rapportent le cas d'une volumineuse tumeur du gros orteil développé sur un ongle incarné chez un patient de 34 ans. Ce patient a été pris en charge chirurgicalement avec exérèse de la tumeur et cure d'ongle incarné. Il s'agit d'une tumeur exceptionnelle par la taille qu'elle a atteint: 2cm de diamètre, dont la nature a été

confirmée sur étude anatomopathologique. Le patient a été revu en consultation régulièrement, la cicatrisation a été obtenue vers la 3eme semaine, pas de récurrence avec un recul de 6 mois.



**Figure 1:** image montrant une tumeur de 2 cm de diamètre développée sur un ongle incarné du gros orteil