

Annexe 1: principales définitions des cas de paludisme cliniques et graves dans l'étude de Phase III

Encadré

Principales définitions des cas de paludisme cliniques et graves dans l'étude de Phase III

Paludisme clinique :

Un enfant malade et amené pour un traitement dans un établissement de santé,
AVEC de la fièvre (température axillaire $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$) au moment de la visite
ET une parasitémie des formes asexuées de *P. falciparum* $> 5\,000$ parasites par mm^3
OU
Un cas de paludisme répondant à la définition principale du paludisme grave.

Paludisme grave :

Un enfant hospitalisé avec $> 5\,000$ parasites *P. falciparum* par mm^3

ET avec au moins un des marqueurs de sévérité suivant :

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Prostration• Détresse respiratoire• Score de Coma de Blantyre ≤ 2• Deux convulsions ou plus | <ul style="list-style-type: none">• Hypoglycémie $< 2,2 \text{ mmol/L}$• Acidose BE $\leq -10,0 \text{ mmol/L}$• Lactate $\geq 5,0 \text{ mmol/L}$• Anémie $< 5,0 \text{ g/dL}$ |
|--|--|

ET sans diagnostic de comorbidité

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Pneumopathie prouvée par radiographie• Méningite à l'examen du liquide céphalo-rachidien | <ul style="list-style-type: none">• Culture de sang positive• Gastroentérite avec déshydratation |
|---|---|

Hospitalisation pour paludisme :

Une hospitalisation médicale avec la confirmation de $> 5\,000$ parasites *P. falciparum* par mm^3 , en excluant les admissions planifiées pour des soins médicaux, une chirurgie élective ou un traumatisme