

Case report

Appendicite aigüe à manifestation clinique gauche sur mésentère commun complet: à propos d'un cas

Aziz Elmadi^{1,8}, Hanan Bouamama¹, Mohammed Rami¹, Khalid Khattala¹, Abderrahman Affi¹, Yousef Bouabdallah¹

¹Service de chirurgie pédiatrique, CHU Hassan II de Fès, Fès, Maroc

⁸Corresponding author: Service de chirurgie pédiatrique I, CHU Hassan II, Fès 30000, Tel: 00212661584394, Maroc

Key words: Malrotation intestinale, appendicite, fosse iliaque gauche

Received: 21/10/2010 - Accepted: 08/11/2010 - Published: 18/11/2010

Abstract

La malrotation intestinale chez l'enfant est une anomalie rare due à un arrêt des phénomènes de rotation et d'accolement de l'intestin primitif. Elle peut être grave en cas de mésentère commun incomplet en se compliquant d'un volvulus du grêle ou asymptomatique si la rotation s'arrête à 90° se déclarant ainsi par des formes atypiques d'appendicite comme c'est le cas de notre observation. Il s'agit d'un garçon de 15 ans qui a présenté une semaine avant son admission des douleurs abdominales diffuses avec vomissements alimentaires évoluant dans un contexte fébrile et chez qui l'examen clinique avait montré une sensibilité de la fosse iliaque gauche. Le bilan biologique avait objectivé un syndrome inflammatoire biologique. Les examens radiologiques étaient en faveur d'un mésentère commun complet avec multiples adénopathies mésentériques et infiltration de la graisse mésentérique. L'exploration coelioscopique a confirmé le diagnostic de malrotation avec appendicite aigüe. L'évolution après l'appendicectomie était favorable. Si l'appendicite aigüe dans sa forme habituelle est une urgence chirurgicale fréquente chez l'enfant, ses formes atypiques dans le cadre d'une malrotation intestinale ou d'un situs inversus restent très difficiles à diagnostiquer. L'imagerie moderne notamment la tomographie assistée par ordinateur (TDM) abdominale puis la coelio-chirurgie ont beaucoup contribué au diagnostic de ces formes.

Pan African Medical Journal. 2010 7:13

This article is available online at: <http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/7/13/full/>

© Aziz Elmadi et al. The Pan African Medical Journal - ISSN 1937-8688. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Introduction

L'appendicite aiguë est l'urgence chirurgicale la plus fréquente d'une douleur de la fosse iliaque droite chez l'enfant, son siège à gauche suite à une malrotation intestinale est extrêmement rare et donc souvent responsable d'un retard diagnostique. L'imagerie permet un diagnostic anatomique et lésionnel précis orientant donc la voie d'abord chirurgicale.

Patient et observation

Il s'agit d'un garçon de 15 ans sans antécédents pathologiques particuliers qui a présenté une semaine avant son admission des douleurs abdominales diffuses avec vomissements alimentaires évoluant dans un contexte fébrile sans troubles de transit, ce qui a amené l'enfant à consulter et à être mis sous antibiotiques, sans amélioration.

L'examen clinique à l'admission a trouvé une température à 37°C avec sensibilité de la fosse iliaque gauche sans masse palpable, devant cette symptomatologie, un bilan biologique a été réalisé avec notamment une Numération Formule Sanguine (NFS) qui avait montré un taux d'hémoglobine à 11,8 g/dl, une hyperleucocytose à 17040 /mm³ à prédominance neutrophile, la C-reactive protein (CRP) était augmenté à 200 mg/l.

L'échographie abdominale a révélé une infiltration de la graisse avec multiples adénopathies et épanchement finement échogène de la fosse iliaque gauche; un lavement baryté a objectivé une projection à gauche du colon ascendant, du transverse et du colon descendant réalisant un aspect fortement évocateur d'un mésentère commun complet (Figure 1). Un complément scannographique a décelé une transposition des vaisseaux mésentériques supérieurs avec importante infiltration de la graisse mésentérique (Figure 2). Sur l'ensemble de ses arguments, il a été décidé une exploration coelioscopique par un optique de 10 mm introduit au niveau de l'ombilic; ceci a mis en évidence quelques adhérences entre la paroi abdominale antérieure et le carrefour iléo-caecal placé au niveau de la fosse iliaque gauche (Figure 3) ainsi que de multiples adénopathies mésentériques. Un épanchement trouble de faible abondance a été prélevé pour étude cytot bactériologique.

Le diagnostic de mésentère commun complet a été confirmé du moment que tout le grêle siégeait à droite et le colon et l'appendice à gauche; ce dernier était très inflammatoire, boudinée. Nous avons procédé à l'aide de deux trocarts opérateurs de 5 mm, à l'aspiration du liquide de la fosse iliaque gauche puis à une appendicectomie après coagulation section du méso appendiculaire. Un lavage localisé au sérum salé 9 ‰ et enfin un drainage par un drain de redon ont été effectués.

Les suites opératoires ont été simples; l'étude anatomo-pathologique de la pièce opératoire est revenue en faveur d'une appendicite inflammatoire; l'évolution était favorable avec un recul de 6 mois.

Discussion

Les anomalies congénitales du tractus gastro-intestinal sont une cause importante de morbidité chez les enfants et, moins fréquemment, chez les adultes [1]. Ces anomalies congénitales incluent les atrésies de l'intestin grêle et du côlon, les anomalies de rotation et de fixation, les anomalies ano-rectales et les duplications intestinales. Après une rotation normalement déroulé dans la vie intra-utérine, le mésentère a une base large qui s'étend de l'hypocondre gauche à la fosse iliaque droite.

La malrotation intestinale est une rotation anormale ou incomplète de l'intestin moyen responsable d'un mésentère raccourcie avec ligament de Treitz et caecum mal fixés [1]. Cette malrotation peut se compliquer d'un volvulus du grêle surtout en cas d'arrêt de la rotation à 180° [2] ou être asymptomatique lorsque l'arrêt se fait à 90° responsable donc d'un mésentère commun complet qui se complique rarement et dont la découverte est généralement fortuite lors des examens radiologiques réalisés pour d'autres indications.

L'observation qu'on rapporte révèle un autre mode de découverte de cette anomalie; une appendicite avec manifestation clinique gauche. L'appendicite est la cause d'environ un tiers des abdomens aigus mais sa localisation gauche est extrêmement rare [3]. Une revue de la littérature récente rapporte 63 cas qui s'inscrivent dans le cadre d'un situs inversus [4-6]. Les cas rapportés dans le cadre d'une malrotation avec mésentère commun complet sont encore plus rares [7,8]; cette localisation inhabituelle est responsable d'un retard de diagnostic pouvant être à l'origine de complications graves. Avec l'avènement de l'imagerie moderne notamment l'échodoppler et la tomographie par ordinateur qui cherchent une transposition des vaisseaux mésentériques et l'emplacement du grêle par rapport au colon, le diagnostic se fait de plus en plus précocement [9-11].

La laparoscopie est primordiale dans ces cas puisqu'elle permet de confirmer l'anomalie anatomique puis proposer un traitement qui consisterait à une appendicectomie sous coelioscopie [12]. En l'absence de cette technique, la tomographie par ordinateur (TDM) abdominale permet d'orienter la voie d'abord chirurgicale [9,13].

Conclusion

Si l'appendicite est la pathologie chirurgicale abdominale la plus fréquemment rencontrée aux urgences pédiatriques, sa présentation atypique chez les patients ayant une malrotation intestinale présente un défi diagnostique. Il nécessite une imagerie appropriée reposant très souvent sur le scanner ainsi qu'une bonne connaissance des variabilités anatomiques du tube digestif. Le traitement a beaucoup bénéficié de la chirurgie laparoscopique.

Conflits d'intérêts

Les auteurs ne déclarent aucuns conflits d'intérêts.

Figures

Figure 1: Lavement baryté montrant tout le colon à gauche

Figure 2: Coupe scannographique objectivant une transposition des vaisseaux mésentériques supérieurs

Figure 3: Image peropératoire révélant des adhérences entre la paroi abdominale antérieure et le carrefour iléo-caecal placé au niveau de la fosse iliaque gauche

Contribution des auteurs

Aziz Elmadia participé à la prise en charge du malade et à la rédaction de l'article, Hanan Bouamama a participé à la prise en charge du malade, Mohammed Rami et Khalid Khattala ont participé à la recherche bibliographique et à la prise en charge du malade, Abderrahman Afifi a participé à la prise en charge du malade, Youssef Bouabdallah a participé à la prise en charge du malade et à la rédaction de l'article.

Références

1. Pinto A, Raimondo DD, Tuttolomondo A et al. An atypical clinical presentation of acute appendicitis in a young man with midgut malrotation. *Radiography*. 2007; 13: 164-8
2. Powell DM, Othersen HB, Smit CD. Malrotation of the Intestines in Children: The Effect of Age on Presentation and Therapy. *J Pediatr Surg*. 1989 Aug;24(8):777-80. **This article on PubMed**
3. Nelson MJ, Pesola GR. Left lower quadrant pain of unusual cause. *J Emerg Med*. 2001;20(3):241-5. **This article on PubMed**
4. Akbulut S, Caliskan A, Ekin A et al. Left-sided Acute Appendicitis with Situs Inversus Totalis: Review of 63 Published Cases and Report of Two Cases. *J Gastrointest Surg*. 2010; 14: 1422-8. **This article on PubMed**
5. Huang SM, Yao CC, Tsai TP, Hsu GW. Acute appendicitis in situs inversus totalis. *J Am Coll Surg*. 2008; 207: 954. **This article on PubMed**
6. Kassi A, Kouassi JC. Appendicite aiguë sur situs inversus: une forme topographique à ne pas méconnaître à propos d'un cas. *Med Afr Noire* 2004, 51: 429-31.
7. Welte FJ, Grosso M. Left-sided appendicitis in a patient with congenital gastrointestinal malrotation: a case report. *Journal of Medical Case Reports*. 2007; 1:92. **This article on PubMed**
8. Flesch J, Oswald P, Grebici M et al. Mésentère commun complet révélé par une appendicite perforée gauche. *J Radiol*. 2010; 91:915-6. **This article on PubMed**
9. Israelit S, Brook OR, Nira BR, Guralnik L, Hershko D. Left-sided perforated acute appendicitis in an adult with midgut malrotation: the role of computed tomography. *Emerg Radiol*. 2009 May;16(3):217-8. **This article on PubMed**
10. Perera WR, Hennessy OF. Clinical Images - An unusual case of appendicitis. *Am J Surg*. 2010 Jun;199(6):e79-8. **This article on PubMed**
11. Nisolle JF, Bodart E. Appendicite aiguë d'expression clinique gauche: apport diagnostique de la tomodensitométrie. *Arch Pediatr*. 1996; 3: 47-50. **This article on PubMed**
12. Golash V. Laparoscopic management of acute appendicitis in situs inversus. *J Min Access Surg*. 2006; 2: 220-1
13. Cissé M, Touré AO, Konaté I, Dieng M, Ka O, Touré FB, Dia A, Touré CT. Appendicular peritonitis in situs inversus totalis: a case report. *J Med Case Reports*. 2010 May 11;4:134. **This article on PubMed**



Figure 1
Lavement baryté montrant tout le colon à gauche



Figure 2
Coupe scannographique objectivant une transposition des vaisseaux mésentériques supérieurs




Figure 3
Image peropératoire révélant des adhérences entre la paroi abdominale antérieure et le carrefour iléo-caecal placé au niveau de la fosse iliaque gauche